

OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 4 francs)

42,896

MÉLANGES  
EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

VINGT-SEPTIÈME FASCICULE

(15 mars 1918)

PAR

**MAURICE PIC**

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE  
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE  
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »  
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS  
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES  
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS

IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE

ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1918

Tous droits réservés

LIBRARY  
MUS. COM. ZOOLOG.  
CAMBRIDGE, MASS.

## COURTES DESCRIPTIONS DIVERSES <sup>(1)</sup>

---

**Scaphosoma liberum** n. sp. Oblongus, castaneus, antennis ad basin, his apice nigris, pedibusque pallidis; thorace minutissime et sparse punctato; elytris minute et sparse punctatis, ad suturam longe et ad basin curte sulcatis, apice minute testaceo marginatis. Long. 3 mill. Cameroun. — Diffère de *S. hybridum* Boh. par les élytres peu et finement ponctués.

**Attagenus ruficolor** n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, luteo sat sparse pubescens, rufus; thorace breve, minute et densissime punctato; elytris minute sat dense punctatis, in disco substriatis; pedibus satis validis. Long. 5 mill. Chine: Yunnan. — Très distinct de *A. nankineus* Pic par la coloration et les élytres faiblement striés sur le disque.

**Pseudothaumaglossa** n. gen. Latus et brevis; pygidio prominulo; thorace lateraliter infra excavato; antennis brevibus, articulo ultimo maximo, valde transverso et infra prolongato.

Voisin de *Thaumaglossa* Redt. et très distinct, à première vue, par la particulière structure du dernier article des antennes, celui-ci est très transversal, un peu échancré en avant pour la réception de l'article précédent, prolongé inférieurement, cultriforme sur sa portion antérieure.

**Pseudothaumaglossa anthrenoides** n. sp. Subovatus, nitidus, minute griseo pubescens, niger, antennis, pedibus, abdomine pygidioque rufis; thorace minute et

---

(1) Tous les types des nouveautés figurent dans la collection Pic.

sparsè punctato, postice ad scutellum oblique sulcatulo; elytris dense rugoso-punctatis. Long. 4 mill. Brésil: Tijuca.

**Orphinus formosanus** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, atro hirsutus, niger, antennis pedibusque testaceis, elytris apice rufo marginatis. Long. 2,5 mill. Formose. — Ressemble à *O. testaceipes* Pic, mais massue antennaire un peu allongée et élytres brièvement marqués de roux au sommet.

**Orphinus apicalis** n. sp. Oblongo-ovatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, antennis pedibusque rufescentibus, elytris nigris, apice late rufis et ad medium rufo fasciatis. Long. 3 mill. Java. — Voisin de *O. Guernei* Pic et très distinct par son aspect moins brillant et les élytres non entièrement foncés.

**Anthrenus multimaculatus** n. sp. Subovatus, opacus, albo maculatus, thorace postice lateraliter transverse albo maculato, elytris ad basin, ante et post medium, postice et ad suturam apice albo maculatis, infra corpore pro parte albo notato. Long. 3 mill. Formose. — Peut se placer près de *A. miniopictus* Bedel.

**Ptinus subsuturalis** n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus, niger, femoribus ad basin tibiisque pro parte rufis; thorace sparse punctato; scutello parum pubescente; elytris latis, substriato-punctatis, postice ad suturam parum dense griseo pubescentibus, infra corpore pro parte dense albo pubescente. Long. 3 mill. Ceylan. — Voisin de *P. Dohertyi* Pic, pattes moins foncées et élytres nettement pubescents sur la suture vers l'extrémité.

**Ptinus Armitagei** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, hirsutus, niger; thorace sparse punctato; scutello fere glabro; elytris substriato-punctatis, antice minute et postice valde attenuatis; infra corpore pro parte albo pubescente. Long. 3 mill. Bornéo. — Voisin de *P. borneensis* Pic, prothorax plus ponctué sur la base, élytres nettement ou plus rétrécis aux extrémités.

**Maheoptinus dilaticollis** n. sp. Elongatus, parum nitidus, pro parte sat dense griseo aut luteo pubescens, niger, capite thoraceque rufis aut piceis, antennis apice pedibusque rufescentibus; thorace satis breve, antice valde dilatato et lateraliter inciso-pubescente; elytris antice et postice albo notatis. Long, 35 mill. Ile Banguéy. — Voisin de *M. Beccarii* Pic, dessins élytraux analogues, en diffère par la tête plus nettement ponctuée et la structure du prothorax.

**Plosima 11-maculata** variétés. — Elongatus, niger, elytris ad apicem luteo maculatis et luteo fasciatis, capite nigro (**v. nov. elongata**) aut capite luteo maculato (**v. nov. coreana**) Ile des Quelpaert. — De forme plus allongée que chez les exemplaires paléarctiques.

**Cladobradus** n. gen. Corpus elongatus; capite prominulo, oculis thorace distantibus; antennis latis, articulis 3 et sequentibus longe dentatis; thorace breve, subarcuato, lateraliter marginato, inæquale, postice sinuato; elytris lateraliter sulcatis, marginatis; pedibus satis elongatis.

Ressemble à *Aploglossa* Guer., très distinct par la structure du prothorax et celle des antennes. Diffère, en outre, de *Cladotoma* Guer. par les yeux moins grands, ne touchant pas le prothorax, la forme du prothorax et les antennes à rameaux moins allongés.

**Cladobradus atritarsis** n. sp. Elongatus, subopacus, sat dense luteo pubescens, testaceus, oculis, antennis pro parte, geniculis tarsisque nigris, thorace in disco lateraliter excavato; elytris elongatis, trisulcatis. Long. 12 mill. Amérique méridionale: Bogota.

**Pseudocladotoma** n. gen. Corpus parum elongatus; capite inclinato, occulto, antennis latis, longe dentatis; thorace antice prominulo, lateraliter marginato, postice sinuato; elytris marginatis; pedibus validis, tarsis posticis 5 articulatis, subprolongatis.

Faciès de *Paralichas* W. et en différant, à première vue,

par la forme du prothorax dont la partie antérieure s'avance sur la tête qu'elle cache en dessus ; les antennes, en outre, sont plus robustes.

**Pseudocladotoma maculata** n. sp. Parum elongatus, nitidus, rufus, antennis pro parte brunneis ; elytris nigris, apice late et ad humeros infra rufo notatis ; thorace rufo, in disco nigro maculato, postice impresso ; elytris punctato-striatis. Long. 9 mill. Java.

**Ernobiotherius nov. gen.** Corpus angustatus ; capite inclinato, occulto ; antennis filiformibus, pilosis ; thorace lateraliter et antice marginato ; elytris angustatis, marginatis ; pedibus satis validis, tarsis posticis elongatis 5 articulatis, articulis inlobatis.

Ce nouveau genre, avec sa tête cachée en dessus, a un faux air d'*Ernobius*, son prothorax complètement et fortement marginé, cachant la tête, le distingue, à première vue, de *Therius* Guer.

**Ernobiotherius angustatus** n. sp. Angustatus, nitidus, griseo pubescens, granuloso punctatus, rufescens, infra corpore, antennis pedibusque pro parte et elytris postice late nigro-piceis ; thorace antice arcuato, angulis posticis prominulis ; elytris in disco substriatis, dense punctatis. Long. 4 mill. Ile Banguay.

**Scirtes atronotatus** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufescens, oculis nigris, elytris ad basin, ad medium et lateraliter nigro maculatis, sutura nigra. Long. 2,5 mill. Bogota. — A placer près de *S. Le Moulti* Pic, dont il diffère, à première vue, par ses macules élytrales.

**Scirtes bogotensis** n. sp. Subovatus, nitidus, rufescens, elytris lateraliter apice et ad suturam pro parte pallidioribus ; thorace minute et sparse punctato ; elytris sat fortiter punctatis. Long. 2,5 mill. Bogota. — Plus large que le précédent et de coloration à peu près uniforme.

**Scirtes bimaculaticeps** n. sp. Elongatus, nitidus, minute et sparse punctatus, niger, antennis ad basin pedibusque rufis, capite ad oculos, thorace lateraliter elytrisque antice ad et postmedium rufo-luteo notatis. Long. 3 mill. Guyane française. — A placer près de *S. variegatus* Guer., dessins élytraux clairs différents, composés de : une petite macule prescutellaire, une fascie transversale post-médiane et antérieurement : une macule allongée posthumérale, une autre suturale, une oblique discale, ces trois formant presque une fascie sinuée.

**Cyphon discocinctus** n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, elytris in disco et ad basin nigro cinctis (forma typica), aut in disco vitta obliqua nigra ornatis (var. *atrolineatus*) minute et sparse punctatus. Long 2 mill. 5. Madagascar. — Voisin de *C. fuscopictus* Frm., mais dessins noirs des élytres différents, formant sur le milieu des élytres un cercle allongé, entourant une grande macule suturale claire de la coloration générale.

**Cyphon notatus** n. sp. Subovatus, nitidus, rufescens, antennis ad basin pedibusque pallidioribus, elytris pallidotestaceis, ad basin late piceo notatis, sutura picea. Long. 2 mill. Madagascar. — Plus court que le précédent avec les élytres autrement marqués de foncé.

**Cyphon formosanus** n. sp. Subovatus, nitidus, dense pubescens, minute, pro parte dense punctatus, rufescens ; antennis gracilibus, articulo primo valido, capite lato ; thorace breve, valde transverso ; elytris subovatis, apice attenuatis, antice ad suturam late depressis. Long. 4 mill. Formose. — Peut se placer près de *C. variabilis* Thb., plus robuste avec le 1<sup>er</sup> article des antennes plus gros.

**Cyphon atripennis** n. sp. Subovatus, nitidus, sat dense pubescens, minute et sparse punctatus, nigro-piceus, antennis ad basin, pedibus thoraceque rufescentibus ; articulo primo antennarum elongato ; elytris antice ad suturam

impressis. Long. 2 mill. Formose. — Très différent du précédent par la coloration, le premier article des antennes allongé, la ponctuation moins serrée de l'avant-corps, etc.

**Artematopus irroratus v. nov. 4-notatus.** Elytris nigro 4 maculatis; macula humeralis, maculis duabus post medium et macula, aliquot oblitterata, postica. Costa-Rica.

**Artematopus nigropunctatus** n. sp. Elongatus, nitidus, castaneus, macula frontalis, thorace lateraliter, antennis pedibusque pallidioribus; elytris pallidis, ad basin castaneo maculatis, oblique et sinuato nigro fasciatis, his nigro punctatis. Long. 9 mill. Amérique méridionale. — Voisin du précédent, très distinct par sa macule antérieure élytrale châtain et bordée de noir.

**Artematopus bifasciatus** n. sp. Oblongo-ovatus, nigro-piceus, pedibus pro parte pallidioribus, thorace lateraliter testaceo, elytris testaceis, antice et postice oblique piceo fasciatis, sutura brunnea. Long 6 mill. Bogota. — Voisin de *A. discoidalis* Pic, avec les élytres à dessins noirs différents.

**Carphurus atromaculatus** n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, antennis, articulis primis rufis exceptis, elytris, pedibus intermediis et posticis pro majore parte et infra corpore nigris; abdomine rufo, segmentis primis supra nigro maculatis. Long. 7-8 mill Java (Rouyer). — Peut se placer près de *C. rubroannulatus* Mots.

**Carphurus birmanicus** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite antice (labro nigro), antennis ad basin, pedibus anticis pro parte abdomineque pro parte rubro-testaceis; capite elongato; thorace satis breve, antice et postice attenuato; elytris elongatis, mediocre sat sparse punctatis; abdomine pro parte nigro, pro parte testaceo. Long. 7 mill. Birmanie. — Voisin du précédent, mais tête en partie foncée, pattes antérieures non entièrement testacées, etc.



**Carphurus Kurandanus** n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, oculis nigris, antennis nigris, ad basin late testaceis, his filiformibus; thorace elongato, fere læve; elytris elongatis, parallelis, minute sat dense punctatis. Long. 8 mill. Kuranda. — Par sa coloration voisin de *C. luteolus* Er. (ex description), mais antennes plus grêles, front irrégulièrement déprimé, etc.

**Carphurus cinctipennis** n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, oculis, antennis apice late, scutello et infra corpore pro parte nigris, elytris testaceis, nigro cinctis; antennis satis validis; thorace parum elongato; elytris satis elongatis, mediocre sat dense punctatis. Long. 6 mill. Timor. — Voisin du précédent, distinct, à première vue, par sa coloration élytrale.

**Carphurus plicaticollis** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, capite plus minusve, antennis ad basin rufis, femoribus apice, et tibiis ad basin aliquot, plus minusve testaceis; antennis in mare validis et capite plicato; elytris elongatis subparallelis, dense ruguloso-punctatis. Variat: thorace nigro (forma typica), aut nigro et rufo maculato (v. *curdaiensis*), aut rufo et postice nigro notato (v. *notaticollis*), aliquot rufo (v. *rufithorax*). Long. 4-6 mill. Nouvelle Guinée. — Espèce très distincte par les plis transversaux de son prothorax.

**Spermophagus multilineolatus** n. sp. Subovatus, et latus, niger, griseo pubescens, pro parte albo maculatus aut lineolatus; antennis satis elongatis; thorace breve, antice attenuato, sat dense ruguloso-punctato; elytris punctato-striatis, albo lineolatis; pygidio dense albido pubescente; spinulis rufis. Long. 3,5 mill. Chine: Yunnan. — Plus large que le précédent avec le revêtement du dessus différent.

**Spermophagus semiannulatus** n. sp. Subovato-

*elongatus*, postice valde attenuatus, nitidus, niger, griseo sparse pubescens, supra albido et sinuato fasciatis, infra corpore lateraliter albo maculato, pygidio nigro, ad basin et lateraliter antice dense albo limbato. Long. 2 mill. Manille. — Espèce très distincte par son pygidium foncé, présentant antérieurement un demi anneau blanc. A placer près de *S. albosparsus* Gylh.

**Spermophagus Javanus** n. sp. Subovatus et latus, niger, pro parte fulvo, pro parte albido, pubescens, elytris parum distincte albido bifasciatis (fascia prima ad suturam interrupta, secunda fere integra), pygidio ad basin dense albido pubescente, in medio albo lineato. Long. 2,5 mill. Java. — Sans doute voisin de *S. subsignatus* Gylh. qui ne m'est pas connu en nature.

**Spermophagus kiotensis** n. sp. Oblongo-ovatus, niger, luteo aut griseo pubescens, elytris minute et sparse albo maculatis, pygidio abdomineque pro parte luteo pubescentibus; scutello albo; spinulis testaceis. Long. 4 mill. Japon: Kioto. — Diffère, à première vue, du précédent par l'abdomen foncé.

**Spermophagus minasensis** n. sp. Oblongo-ovatus, niger, griseo pubescens, supra pro parte et irregulariter undulatus, antennis ad basin, geniculis anticis et intermediis, abdomine pygidioque testaceis; spinulis rufis. Long. 4 mill. Brésil: Minas. — Voisin de *S. rufiventris* Boh. par sa coloration abdominale, mais pattes presque entièrement foncées, élytres nettement mouchetés de gris, etc.

**Spermophagus longicornis** n. sp. Oblongo-ovatus, niger, parum dense griseo aut luteo pubescens, antennis ad basin, geniculis anticis et intermediis rufis; antennis elongatis; thorace pro parte et fortiter punctato; elytris striato-punctatis; spinulis rufis. Long. 3 mill. Afrique méridionale occidentale. — Peut se placer près de *S. natalense* Fahr.,

distinct, à première vue, par la base des antennes rousse, ces organes étant, en outre, plus longs.

**Spermophagus latipennis** n. sp. Subovatus et latus, niger, sat dense luteo et pro parte disperse griseo pubescens; antennis satis brevibus; thorace pro parte fortiter et sparse punctato; elytris lato-subovatis, punctato-striatis, postice deplanatis; scutello albo; pygidio fortiter punctato; spinulis rufis. Long. 3,3 mill. Afrique orientale anglaise. Ressemble au précédent par son revêtement, mais bien plus large avec les antennes plus courtes, etc.

**Spermophagus fulvopubens** n. sp. Subovatus, niger, dense pubescens, supra fulvo pubescens, infra pro parte griseo pubescens et pro parte (lateraliter et in pygidio) luteo pubescens; scutello albido; spinulis rufis. Long. 4 mill. Dahomey. — Voisin de *Sp. hottentatus* Fahr. mais revêtu d'une pubescence plus dense et de couleur différente.

**Spermophagus sinensis** n. sp. Subovatus, satis latus, niger, supra mediocre griseo pubescens et infra dense albido pubescens; antennis elongatis; thorace breve, antice attenuato, pro parte disperse punctato; elytris punctato-striatis; spinulis rufis. Long. 3 mill. Chine: Yunnan. — Elytres plus parallèles sur les côtés que le précédent avec le revêtement différent.

**Falsodebilis** nov. gen. Oculis incisus; antennis gracilibus; thorace elongato, lateraliter sinuato, antice et postice transverse sulcato, lateraliter longitudinaliter sulcato-pubescente, sulcis pubescentibus; elytris satis elongatis, apice acuminatis; femoribus pedunculatis, intermediis postisque arcuatis, pedibus posticis longissimis. — Genre caractérisé par sa particulière structure prothoracique jointe à ses pattes plus ou moins longues, à cuisses très grêles à la base puis très en massue à l'extrémité. Paraît se rapprocher (ex-description) de *Ischnorrhabda* Gglb.

**Falsodebilia metallica** n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-viridescens, griseo et pro parte dense pubescens et albo hirsutus; thorace elongato, inæquale, lateraliter dense rugulosoque punctato, in disco læve aut sparse punctato, sulcis pubescentibus munitis; elytris ad medium paulo strangulatis, apice ad suturam parum dehiscentibus; infra corpore dense pubescente; pedibus longe et sparse pilosis. Long. 10 mill. Chine: Yunnan.

**Exocentrus curtipennis** n. sp. Robustus, atro hirsutus, nigro-piceus, antennis pro parte rufescentibus, thorace antice rufo limbato; capite sulcato; thorace breve et lato, minute spinoso; elytris satis brevibus, sat dense griseo pubescentibus, pro parte glabro maculatis, postice oblique et parum distincte nigro fasciatis. Long. 5 mill. Japon. — Voisin de *E. guttulatus* Bat., pubescence autrement disposée sur les élytres et grise, le dessus sans reflets métalliques, etc.

**Pogonochærus tuberculatus** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, antennis, thorace antice et postice, elytris (his ad basin piceis) pedibusque rufescentibus; antennis minutis, brunneo-annulatis; thorace parum elongato, lateraliter acute spinoso; elytris subparallelis, in disco irregulariter multi sed minute tuberculatis, his pro parte breve fasciculatis, apice rotundatis; pedibus rufescentibus, femoribus ad basin tibiisque pro parte pallidioribus. Long. 5 mill. Japon: Kioto. — Ressemble un peu à *P. fasciculatus* Deg., mais de forme plus allongée, épines du prothorax très saillantes, etc.

**Lychrosis albonotatus** n. sp. Robustus, niger, griseo pubescens, capite thoraceque in disco, et lateraliter late, luteo notatis; elytris griseo pubescentibus, fortiter nigro punctatis, antice lateraliter et postice, lateraliter et in disco, albo-notatis. Long. 4-5 mill. Tonkin. — A placer près de *L. zebrinus* Pascoe.

**Nilio luteonotatus** n. sp. Latus, postice attenuatus,

rufo testaceus, elytris nigris, lateraliter testaceo-marginatis et in disco irregulariter et minute luteo notatis, his irregulariter punctatis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *N. lanatus* Germ. distinct, à première vue, par ses élytres offrant des maculés jaunâtres.

***Nilio latipennis*** n. sp. Latus et brevis, pallido-testaceus, antennis apice et infra corpore nigris; elytris 18 lineato-punctatis, intervallis minutissime punctatis. Long. 8-10 mill. Pérou. — Voisin de *N. peruvianus* Ths., élytres plus courts, à ponctuation sériale moyenne.

***Nilio insuturalis*** n. sp. Latus, apice attenuatus; rufo-testaceus, antennis apice nigris, elytris piceis, lateraliter late rufo-testaceo limbatis; elytris 18 lineato-punctatis, intervallis fere lævibus. Long. 8 mill. Guyane Française. — Voisin de *N. amazonicus* Ths., en diffère par le prothorax concolore et la suture foncée.

***Nilio ruficeps*** n. sp. Latus, hemisphæricus. rufo-testaceus, antennis apice nigris, thorace in disco vage brunnescente; elytris brunneis, lateraliter rufo-testaceis; elytris 18 lineato-punctatis, intervallis lævibus. Long 6 mill. Guyane: Maroni. — Voisin de *N. coccinelloides* Cast. mais suture de la coloration du disque et tête rousse.

***Nilio argentinus*** n. sp. Latus, subhemisphæricus, piceus, elytris fere uniformiter coloratis, 18 lineato punctatis, intervallis punctatis. Long. 7 mill. République Argentine. — Voisin de *N. suturalis* Thms. par sa ponctuation élytrale, mais de coloration plus foncée et paraissant uniforme.

***Nilio argentinus v. nov. brasiliensis***. Piceus, elytris testaceo cinctis, epipleuris testaceis. Brésil.

***Nilio punctatissimus*** n. sp. Latus, hemisphæricus, niger, thorace scutelloque rufis, elytris nigris, ad suturam

minute rufo limbatis ; elytris 18 lineato-punctatis, intervallis dense punctatis. Long. 9 mill. Buenos-Ayres. — Voisin de *N. collaris* Ths. mais suture testacée et dessous foncé.

***Nilio ruber*** n. sp. Brevis et latus, ruber, capite postice thoraceque in disco brunneo-piceis ; elytris 22 lineato-punctatis, intervallis fere impunctatis. Long. 7 mill. Brésil. — Très voisin de *N. Thomsoni* Chp., mais antennes rousses avec le disque du prothorax et la majeure partie de la tête foncés.

***Nilio rufescens*** n. sp. Subhemisphæricus, rufescens, capite thoraceque in medio piceis, elytris in disco vage brunnescentibus, 22 lineato-punctatis, intervallis fere lævibus. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin de *N. brunneus* Th. dont il diffère, au moins à titre de variété, par les antennes et la tête en partie testacés.

***Nilio Gounellei*** n. sp. Valde convexus, subhemisphæricus, longe griseo pubescens, nigro-piceus, capite antice, antennis ad basin, thorace lateraliter pedibusque testaceis ; elytris pro parte et minute testaceo limbatis, lineato-punctatis et in disco pro parte irregulariter punctatis. Long. 5-6 mill. Brésil. Distinct par sa particulière ponctuation élytrale.

***Nilio Gounellei*** v. n. ***notatus***. Antennis nigris, capite postice piceo, elytris piceis, pro parte rufo limbatis et in disco vage rufo notatis. Brésil.

***Nilio minutus*** n. sp. Minor, hemisphæricus, rufescens, lateraliter pallidior ; elytris 18 lineato-punctatis, intervallis lævibus. Long. 4,5 mill. Bogota. — Espèce reconnaissable à sa petite taille jointe à sa coloration à peu près uniforme. Peut se placer près de *N. marginellus* Er.

***Nilio punctatus*** n. sp. Minutissimus, subhemisphæricus, rufescens, elytris piceo-metallescentibus, lateraliter late rufescentibus, his fortiter punctatis et parum distincte

lineato-punctatis. Long. 3 mill. Brésil : Bahia. — Espèce très distincte par sa ponctuation à peu près uniforme jointe à sa coloration. A placer près de *N. marginellus* Er.

**Leiochrodes Mocquerysi** n. sp. Hemisphæricus, nitidus, rufo-testaceus, fere impunctatus. Long. 4 mill. Gabon. — Voisin de *L. vernicatus* Frm. très distinct par sa coloration uniforme claire.

**Leiochrodes singularis**. n. sp. Latus et satis brevis, apice valde attenuatus, nitidus, rufo-castaneus, thorace in disco et elytris pro parte piceis, antennis piceis, ad basin rufis, fere impunctatis ; elytris latis et brevibus, apice valde attenuatis, fortiter marginatis. Long. 6 mill. Ceylan. — Espèce très distincte entre toutes par la forme particulière de ses élytres.

**Leiochrodes latus** n. sp. Subovatus, parum convexus, nitidus, minute punctatus, thorace lateraliter rufescente, antennis pedibusque pro parte brunneis ; capite parum distincto ; thorace antice minute inciso. Long. 6 mill. Indes : Madura. — Voisin du précédent, moins convexe avec les élytres de forme ordinaire.

**Leiochrodes apicicornis** n. sp. Subovatus, nitidus, brunneus, pro parte picescens, capite antice, thorace antice et lateraliter elytrisque, lateraliter et ad suturam pallidioribus ; antennis nigris, ad basin rufis, articulo ultimo pallido ; elytris sat fortiter et sparse punctatis. Long. 5 mill. Ile Engano. — Peut se placer près de *L. rufolimbatus* Frm., très distinct par son dernier article des antennes pâle.

**Leiochrodes luteolineatus** n. sp. Subovatus, nitidus, rubro-testaceus, antennis nigris, ad basin rufis, elytris fere impunctatis, nigris, ad suturam antice et postice lateraliter longe luteo lineatis. Long. 4 mill. Bornéo. — Voisin du précédent, très distinct par sa coloration et la ponctuation des élytres presque nulle.

**Leiochrodes convexipennis** n. sp. Subhæmiphæricus, convexus, nitidus, rufescens, thorace in disco brunnescente; elytris fere impunctatis, piceis, ad suturam rufo marginatis, antennis piceis, ad basin rufis, tibiis posticis subcurvatis. Long. 4 mill. Ile Engano. — De forme plus courte et plus élargie que les précédents. Sans doute voisin de *L. rufolimbatus* Frm.

**Leiochrodes convexipennis v. nov. frontalis.** Thorace rufo, immaculato, capite postice picescente. Nouvelle-Guinée.

**Leiochrodes testaceitarsis** n. sp. Hæmiphæricus, convexus, nitidus, nigro-piceus, thorace lateraliter late, antennis ad basin et elytris ad suturam rufis; pedibus piceis, tarsi testaceis. Long. 3,5 mill. Australie. — A placer près de *L. ruficollis* Frm., en diffère par l'écusson foncé, le disque du prothorax foncé, etc.

**Leiochrodes violaceipennis** n. sp. Hæmiphæricus, convexus, nitidus, niger, elytris violaceipennis, antennis ad basin pedibusque pro parte rufescentibus, thorace elytrisque distincte marginatis, fere lævibus. Long. 2,5 mill. Roon. — A placer près de *L. agathioides* W.

**Leiochrodes subæneus** n. sp. Rotundatus, latus, nitidus, antennis nigris, ad basin aliquot rufis, rufescens, elytris picco-subæneis (forma typica), aut rufescentibus (*v. rotundatus*); elytris brevibus, fere impunctatis. Long. 3,5-4 mill. Ile Banguey. — Espèce remarquable par sa forme arrondie et pouvant prendre place près de *L. ampliatus* Pascoe.

**Leiochrodes punctatus** n. sp. Subovatus, convexus, nitidus, niger, elytris distincte et pro parte lineato punctatis. Long. 4 mill. Indes: Madura. — Espèce très distincte par sa ponctuation élytrale.

**Leiochrodes luteonotatus** n. sp. Subovatus, con-



vexus, nitidus, niger, antennis ad basin pedibusque pro parte rufis, elytris nigris, ad basin, ad medium et ante apicem luteo maculatis, his minute et irregulariter punctatis. Long. 2 mill. Madura. — Très distinct du précédent par sa ponctuation plus irrégulière et les macules élytrales.

**Leiochrodes minutus** n. sp. Minutus, hemisphæricus, nitidus, rufus, elytris nigris, his fere impunctatis, antennis apice piceis. Long. 2 mill. Bornéo. — A placer près de *L. parvulus* W., en diffère par l'écusson roux, les élytres noirs, etc.

**Leiochrodes madurensis** n. sp. Subovatus, convexus, nitidus, niger, antennis pedibusque pro parte rufis, thorace lateraliter postice et elytris ad suturam minute rufescentibus. Long. 4,5 mill. Madura. — Moins court et plus foncé que le précédent, en outre taille plus grande.

**Leiochrodes atripennis** n. sp. Hemisphæricus, parum convexus, nitidus, rufescens, capite postice picescente, antennis elytrisque nigris, his minute punctatis. Long. 3 mill. Iles Salomon. — Voisin de *L. convexus* Lewis, moins convexe avec une forme plus hémisphérique, etc.

**Leiochrotina Braeti** n. sp. Subovato-elongatus, nitidus, rufescens; thorace in disco brunnescente; antennis nigris, ad basin rufis, scutello nigro; elytris cyaneis, lineato punctatis; thorace elongato; tarsis satis gracilibus. Long. 7 mill. Chine : Kurseong (P. Braet). — Espèce très distincte par sa coloration jointe à sa ponctuation.

**Camaria boliviensis** n. sp. Oblongus, postice parum attenuatus et lateraliter undulatus, nitidus, rubro-cupreus; elytris viridi-lineatis. Long. 7 mill. Bolivie. — Très voisin de *C. purpureomaculata* Pic, élytres moins longs, à bandes pourprées régulières et assez larges, etc.

**Camaria parallela v. nov. multimprensa**, Sat

elongatus, nitidissimus, æneus; thorace transverso, marginato, in disco minute et multi impresso; elytris minute striato-punctatis. Guyane française. — Diffère, à première vue, de *C. parallela* Champ. (ex description) par le prothorax ayant, sur le milieu de chaque côté, au lieu d'une grande fossette, plusieurs impressions.

**Camaria rufipennis** n. sp. Elongatus, convexus, parum nitidus, nigro aut piceo viridescens, elytris femoribusque ad basin rufis; capite thoraceque minute et sparse punctatis; thorace postice transverse sulcato; elytris apice subacuminatis, fortiter striatis, striis fere impunctatis; tibiis anticis et intermediis arcuatis. Long. 22 mill. Brésil. — Moins allongé que *C. parallela* Chp., prothorax différent, coloration tout autre, etc.

**Campsia pallidipes** n. sp. Satis latus, postice attenuatus, parum nitidus, rufescens, tibiis tarsisque pallidioribus; thorace transverso, sinuato, fortiter sat sparse punctato; elytris ante humeros subattenuatis, apice subacuminatis et spinosis, distincte punctato-striatis. Long. 23 mill. Brésil. — Diffère de *C. testacea* Sem. par les élytres bien plus larges, la coloration des pattes plus claire, etc.

**Thydemus viridipennis** n. sp. Oblongus, nigro-viridescens, antennis pedibusque pro parte rufescentibus; thorace breve, minute et disperse punctato, angulis anticis prominulis; elytris parum elongatis, apice subacuminatis, minute striato-punctatis, intervallis latis. Long. 12 mill. Java. — A placer près de *T. resplendens* Frm., distinct par les élytres sans macules cuivreuses.

**Thydemus purpureolineatus** n. sp. Oblongus, viridi-metallicus, capite thoraceque purpureo notatis, elytris purpureo et viridi vittatis, antennis pedibusque pro parte rufis; thorace breve, minute et sparse punctato, angulis anticis satis prominulis; elytris satis latis, apice subsinuatis, minutissime striato-punctatis, intervallis latis. Long. 14

mill. Java — Un peu plus robuste que le précédent, avec des bandes pourprées et vertes sur les élytres et l'avant-corps maculé de pourpré.

**Thydemus robustus** n. sp. Oblongus, viridi-metallicus, multi purpureo maculatus aut vittatus, antennis piceis; thorace sat fortiter et sparse punctato, angulis anticis satis prominulis; elytris latis, minutissime striato-punctatis, intervallis latis, deplanatis. Long. 16 mill. Kina-Balu. — Voisin de *T. varicolor* Frm. (décrit comme *Eucyrtus*), coloration très différente, élytres avec des lignes (et non des macules pourprées).

**Thydemus purpureus** n. sp. Oblongus, viridi-metallicus, pro parte et late in disco thoracis et elytrorum purpureis, antennis nigris; thorace breve, mediocre et sparse punctato; elytris striato-punctatis, intervallis subconvexis. Long. 13 mill. Bornéo. — Distinct, outre la coloration, par les élytres nettement striés.

**Thydemus purpureus v. nov. subviridis**. Capite thoraceque subæneis, elytris viridescentibus, minute rubro punctatis. Bornéo.

**Thydemus javanus** n. sp. Oblongus, viridi-metallicus, capite thoraceque diverse purpureo notatis, elytris multi purpureo et viridi vittatis, antennis brunneis aut piceis; thorace breve, fortiter sat sparse punctato, angulis anticis parum prominulis; elytris minute striato-punctatis, intervallis subconvexis. Long. 12-13 mill. Java. — Voisin du précédent, coloration élytrale différente.

**Thydemus sinuatipes** n. sp. Oblongé-elongatus, viridi-metallicus, pro parte purpureus, elytris purpureo et viridi vittatis, antennis plus minusve testaceis, tibiis intermediis et posticis sinuatis. Long. 12 mill. Sumatra. — Voisin du précédent, forme plus allongée et très distinct par la structure de ses tibias.

**Thydemus curtipes** n. sp. Elongatus, viridi-metallicus, pro parte purpureo tinctus, elytris viridibus, minute purpureo vittatis ; pedibus brevibus, tibiis anticis et intermediis curvatis. Long. 13 mill. Bornéo : Brunei. — Voisin du précédent et distinct par ses pattes antérieures robustes et les tibias postérieurs droits.

**Thydemus punctatus** n. sp. Elongatus, viridis, metallicus, capite thoraceque vage purpureo maculatis, elytris cupreis, viridi lineatis ; antennis femoribusque ad basin testaceis ; thorace fortiter et dense punctato, angulis anticis parum prominulis ; elytris elongatis, sat fortiter, striato-punctatis. Long. 14-15 mill. Indes : Madura. — A placer près de *T. purpureovittatus* Mars. moins allongé, dessous foncé, etc.

**Thydemus minutus** n. sp. Oblongo-elongatus, æneus, antice corpore et infra pro parte viridi tinctis, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis ; thorace valde transverso, minute et sparse punctato, subsulcato ; elytris minute striato-punctatis, intervallis subconvexis. Long. 7 mill. Java — Voisin de *T. helopinus* Frm. et distinct, à première vue, par les élytres concolores, sans bandes pourprées.

**Thydemus curvipes** n. sp. Oblongo-elongatus, viridimetallicus, pro parte æneus, antennis ad basin pedibusque pro parte rufis ; thorace minute et sat sparse punctato, angulis anticis parum prominulis ; elytris minute striato-punctatis, intervallis subconvexis ; tibiis anticis valde curvatis et apice dilatatis, intermediis curvatis. Long. 12 mill. Ile Banguéy. — Plus large que le précédent et tibias différents ; pattes moins courtes que chez *T. curtipes* Pic.

**Thydemus Raffroyi** n. sp. Oblongo-elongatus, viridimetallicus, infra corpore minute et pedibus late purpureo tinctis, antennis rufis, elytris cupreo-purpureis, ad suturam et lateraliter viridi tinctis ; thorace mediocre et sparse punctato ; elytris fortiter punctato-striatis, intervallis valde

convexis. Long. 10 mill. Zanzibar (Raffray). — C'est la première espèce africaine décrite dans ce genre.

**Thydemus parvulus** n. sp. Oblongo-elongatus, viridimetallicus, pro parte purpureo tinctus, elytris ad suturam et lateraliter late purpureo vittatis ; antennis piceis. Long. 6 mill. Zanzibar. — Plus petit que le précédent, stries moins profondes et coloration différente.

**Thydemorphus** n. gen. Corpus elongatus ; antennis gracilibus ; oculis magnis, thorace paulo distantibus ; thorace transverso, marginato, angulis anticis rotundatis ; pedibus satis validis, tarsis anticis et intermediis latis, pilosis ; prosterno postice prominulo ; mesosterno antice excavato, subarcuato.

Faciès du genre *Thydemus* Lewis, mais différent, à première vue, par les yeux moins rapprochés du prothorax et le prothorax à angles antérieurs non saillants en avant.

**Thydemorphus pilitarsis** n. sp. Elongatus, viridimetallicus, vage pro parte æneo-tinctus, antennis nigris, ad basin rufescentibus ; thorace minute et sparse punctato ; elytris apice acuminatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis ; tibiis antice subcurvatis, apice pilosis, femoribus intermediis posticisque subcurvatis. Long. 13 mill. Iles Philippines.

**Erulipothydemus** n. gen. Corpus plus minusve elongatus ; antennis gracilibus, articulo 3<sup>e</sup> longissimo ; oculis magnis, thorace paulo distantibus ; thorace transverso, marginato, angulis anticis nullis ; pedibus satis validis, tarsis anticis et intermediis latis, pilosis ; elytris ad basin subgibbosis, apice breve mucronatis ; prosterno postice prominulo ; mesosterno antice excavato, triangulare.

Voisin du genre précédent, mais mesosternum de forme différente et élytres mucronés au sommet. D'autre part ressemble à *Erulipus* Frm., dont la place réelle me semble être

dans le voisinage de *Thydemus* Lewis, dont il diffère (ex description), au moins, par le mucron des élytres et le 3<sup>e</sup> article des antennes bien plus long que le 4<sup>e</sup>.

**Erulipothydemus latior** n. sp. Satis elongatus, viridi metallicus, pro parte purpureo tinctus, elytris viridibus, minute et purpureo striatis, antennis piceis, femoribus ad basin testaceis ; thorace mediocre et sparse punctato, in disco diverse impresso ; elytris satis latis, lateraliter subinuatatis, apice attenuatis, minute striato-punctatis, intervallis subconvexis. Long. 18 mill. Sumatra.

**Erulipothydemus longipennis** n. sp. Angustatus, supra viridi-metallicus, (forma typica), aliquot pro parte purpureo tinctus (**v. bicolor**), antennis pedibusque metallicis, coxis rufis aut piceis ; thorace minute et sparse punctato (*forma typica*), aut fere impunctato (**var. bicolor**) ; elytris subparallelis, apice attenuatis, minute striato-punctatis. Long. 16-17 mill. Bornéo. — Très distinct du précédent par les élytres de forme bien plus étroite.

**Cuphotes apicalis** n. sp. Elongatus, paulo gibbosus, niger, elytris flavis, multi nigro maculatis et apice minute nigro notatis. Long. 19 mill. Brésil. -- Voisin de *S. marmoratus* Ths., moins gibbeux et plus allongé avec le prothorax entièrement noir.

**Cuphotes cœruleus** n. sp. Oblongus, sat convexus, postice dilatatus, nitidus, supra cœruleus, infra cyaneo viridescens ; thorace crebre punctato, laterale fere recto ; elytris minute striato-punctatis ; tibiis anticis curvatis et pilosis. Long. 15 mill. Amazones. — Espèce très distincte par sa coloration jointe à ses élytres peu convexes.

**Pœcilesthus ruficolor** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufescens, antennis apice nigris ; thorace lateraliter subangulato, dense punctato, impresso ; elytris brevibus, substriatis, dense punctatis. Long. 11 mill. Amazones. — Espèce

très distincte par sa coloration. A placer près de *P. octopunctatus* M.

**Pœcilesthus notaticollis** n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, pallidus, thorace elytris que lateraliter nigro marginatis ; thorace in disco bimaculato et elytris antice ad suturam nigro trimaculatis, antennis apice, tibiis tarsisque nigris. Long. 10 mill. Guyane. — Voisin du précédent.

**Pœcilesthus semiviridis** n. sp. Subovatus, parum nitidus, rufus, elytris viridescentibus, antennis fere latis, tibiis tarsisque nigris ; thorace lateraliter subangulato, in disco biimpresso ; elytris brevibus, lineato punctatis. Long. 9 mill. Amazones. — Voisin du précédent, mais tout autre par sa coloration.

**Pœcilesthus rufonotatus** n. sp. Subovatus, fere opacus, rufus, antennis pro parte tarsisque nigris, elytris nigro-subcyaneis, antice et apice breve rufo notatis ; thorace lateraliter subarcuato, sulcato ; elytris latis, minutissime punctato-striatis. Long. 13 mill. Amazones. — A placer près de *P. marginipennis* M.

**Pœcilesthus subopacus** n. sp. Oblongus, supra subopacus, nigro-viridescens, antennis apice et femoribus apice testaceis ; thorace lateraliter subarcuato, in disco antice impresso ; elytris satis elongatis, minutissime lineato-punctatis. Long. 17 mill. Bolivie. — Voisin de *P. eximius* M.

**Pœcilesthus 6-maculatus** n. sp. Oblongus, niger, fere impunctatus, elytris luteis, antice nigro trimaculatis, ad medium undulato fasciatis et apice late nigris. Long. 11 mill. Guyane Française. — A placer près de *P. 4 signatus* M.

**Pœcilesthus rufocinctus** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, capite pro majeure parte thorace que lateraliter rufis, elytris rufocinctis ; thorace antice attenuato, laterale fere recto ; elytris elongatis, minute striatis. Long. 14 mill.

Brésil. — Voisin de *P. geometricus* Perty, très distinct par sa coloration.

**Falsocuphotes n. gen.** Corpus robustus ; antennis brevibus, fere filiformibus ; oculis thorace attangentibus ; thorace lateraliter fere recte et fortiter marginato ; elytris latis, epipleuris longissimis ; prosterno prominulo, triangulare ; mesosterno antice excavato. — Voisin de *Pœcilesthus* Bl. forme courte et large, yeux postérieurement cachés par le bord du prothorax, etc.

**Falsocuphotes curticornis n. sp.** Latus, parum convexus, nitidus, minute punctatus, rufescens, scutello, antennis apice pedibusque pro majore parte nigris. Long. 13 mill. Brésil : Goyaz.

**Spinostatira n. subg.** Femoribus ad basin longe spinosis. Sous-genre établi pour l'espèce suivante, *S. Gounellei* Pic, *acanthomera* Chp. etc.

**Statira spinipes n. sp.** Parum robustus, nitidus, rufescens, pro parte rufo-testaceus, elytris signaturis nigris ornatis (lineola presuturalis, macula mediana discoidalis elongata, his junctis) ; capite lato ; thorace breve, alutaceo, minute et sparse punctato ; elytris latis, subparallelis, minute striato punctatis ; femoribus antice validis, ad basin spina fere recta et elongata minutis. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin de *S. costaricensis* Chp. et s'en séparant (ex description), au moins à titre de variété, par les dessins noirs des élytres différents. Diffère, d'autre part, de *S. Gounellei* Pic, qui possède aussi une épine fémorale mais courbée, par chaque élytre ayant le 1<sup>er</sup> intervalle roux, ces organes de forme moins allongée.

**Statira Gounellei v. nov inapicalis** Rutescens, elytris ad suturam nigro vittatis, capite inter oculos biimpresso, aliquot triimpresso. Brésil. — Très distinct de *S. Gounellei* Pic, par la coloration rousse des pattes, les élytres



à sommet roux, munis d'une bande suturale foncée complète, ou presque complète.

**Statira acanthomera v. nov. rufitarsis.** Niger, antennis, capite antice, geniculis tarsisque rufis. Amazonas.

**Statira inarmipes** n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, elytris ad suturam nigro vittatis et post medium oblique nigro fasciatis (*formi typica*), fascia aliquot oblitterata (**v. nov. semioblitterata**); capite lato; thorace breve, alutaceo, minutissime punctato; elytris subparallelis, apice satis acuminatis, minute striato-punctatis, intervallis pro parte subtuberculato punctatis; femoribus validis, anticis ad basin minute subangulatis. Long 7-8 mill. Brésil. — Forme et faciès de *S. Gounellei* Pic, mais structure fémorale très différente.

**Statira submucronata** n. sp. Elongatus, nitidus, fusco-castaneus, pedibus rufis, elytris viridi-metallicis, apice et lateraliter vage purpureis; capite lato; thorace breve; elytris apice minute mucronatis, striato-punctatis ante apicem in disco vage subimpressis; pedibus satis elongatis, simplicibus. Long. 12 mill. Brésil. — Paraît voisin de *S. viridinitens* Chp., élytres très courtement mucronés et à intervalles presque uniformes.

**Statira bifoveicollis** n. sp. Parum elongatus, subnitidus, rufus, pro parte castaneus, pedibus pallidioribus, capite satis lato; thorace breve, alutaceo, minute et sparse punctato, in disco bifoveolato; elytris striato-punctatis, intervallis postice pro parte tuberculato-punctatis. Long. 8 mill. Brésil: Mineira. — Voisin de *S. mendesensis* Pic, moins foncé avec le prothorax bifovéolé.

**Statira pilosa** n. sp. Parum elongatus, nitidus, sparse pilosus, rufescens, elytris pedibusque pro parte piceis, femoribus ad basin pallidioribus; capite sat lato; thorace

breve, subcordato, minute et sparse punctato; elytris minute striatis, sed fortiter punctatis, intervallis pro parte punctatis; antennis sparse pedibusque pilosis, tibiis anticis validis, parum curvatis. Long. 6 mill. Brésil: Pernambuco. — Paraît voisin de *S. pilipes* Chp., un peu moins poilu avec les pattes antérieures plus robustes.

**Statira superba** n. sp. Robusta, nitida, rufa, elytris, epipleuris exceptis, viridi cupreis; capite breve, oculis magnis; thorace satis robusto, subcordato, minutissime punctato; elytris latis, striato-punctatis, intervallis pro parte impressis. Long. 14 mill. Colombie. — Grande et robuste espèce pouvant prendre place près de *S. diversepunctata* Pic.

**Statira (1) foveicollis** n. sp. Elongatus, nitidus, rufescens, elytris ad medium late et postice minute nigro fasciatis; thorace antice impresso. Long. 6 mill. Brésil: Jataby. — Voisin de *S. brasiliensis* Pic, en diffère par la fascie médiane atteignant la suture, la tête moins rétrécie en arrière, l'impression prothoracique moins allongée.

**Statira atricornis** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite, thorace pedibusque pro parte rufo-testaceis; thorace antice impresso. Long. 6 mill. Brésil: Pernambuco. — Peut se placer près de *S. xanthodera* Chp., distinct, à première vue, par la tête rousse et les élytres presque glabres.

**Statira singularithorax** n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, rubro-testaceus, antennis apice late, oculis, elytris, abdomine pedibusque pro parte nigris; thorace breve, antice longe impresso. Long 8. mill. Bolivie. — Très distinct du précédent par la forme élargie, la longue impression du prothorax, etc.

---

(1) Cette espèce, ainsi que les suivantes et les anciennes à prothorax plus ou moins excavé ou impressionné-fovéolé en avant, peuvent se grouper dans le s. gen. nouveau **Foveostatira** ainsi défini: Thorace antice inciso aut diverse impresso.

TABLE

POUR LE VINGT-SEPTIÈME FASCICULE

---

	Page.
Courtes Descriptions diverses . . . . .	I

---

---

